醫藥顧問

本欄問病。以本報之定戶為限。非定戶而欲問病者。每論一症。須附問病費大洋五角。以示限制。朱振聲醫士答。

□鼻流臭膿

(問)在五六年以前。鼻流黃涕如膿一般。濃而且臭。至今未愈。便是無臭涕的時候。鼻孔中依然有臭氣。有的西醫。不管是何緣由。便將橡皮管子。套在我的鼻孔裏。用石炭酸和硼酸水亂洗一陣。洗過的時候。確實清爽些。但只有一二小時的功效。有的西醫用藥水棉花。藥水布等。塞在鼻腔裏。但棉花和布抽出之後。也只有一二小時的功效。中醫有的說是腦漏。曾試過腦漏方數種。一些沒有效驗。有的說是肺炎。但並有試過肺炎的治法。這個病。經過許多的中西醫生診過。總是沒有見效。因此我便愁着。也許醫不好了吧。在我自己想來。腦漏是無論如何不是的。要是腦漏。這五六年來。腦部一定要受到影響。然而我的腦子。一些沒有變化。或者還是肺裏的。講究能。(方安之)

(答)此病確為腦漏。惟腦漏為俗名。傳說如此。並非真指腦髓漏下也。如真為腦髓下漏。豈特一五六年。腦部要受到影響。「恐未滿頃刻。即有性命之憂。」其病源為鼻竅感受風邪。初則發炎流涕。久而不愈。涕作黃色。漸次濃而且臭。醫書上名為「鼻淵」。其病根在鼻。不在「腦」。亦不在「肺」也。用白芷三錢。蒼耳子一錢五分。辛夷花。薄荷。甘菊花各二錢。桔梗一錢。煎服。如能參用西法洗鼻。內修外補。其效尤易。

□腦漏兼痔

(問)僕體氣素不甚壯健。有腦漏症。時時有清水流下。似有小硬塊。而似黃膿流下。鼻管尖覺有熱。曾經西醫打針服丸藥。亦未見好。據云係腦寒。不知究屬何症。作何良治。請詳示治法。更有痔瘡一病。已患一年餘。初起時。大便後。血即流出。至今年大便後血出不多。而便後時有黃膿水彷彿。出來不多。便後腸管中好似有虫一般在內鑽動。卻不甚痛癢。倘未經醫治。亦祈先生明以指教。得可全痊。當圖後報。(吳玉庭)

(答)腦漏一症。多由傷風鼻塞。失於治療。浸久而致發炎。故時流清水或黃膿。病根即在鼻腔。俗名腦漏。真非為腦子腐敗而漏下也。西醫云。「腦寒」。乃杜撰名詞。不經之談。腦為全體之主宰。若受激刺。將引起全身不快。

□好食麪及香燥之品

(問)現在病情右耳輒鳴不聰。時流膿水。胸痞間或作嘔。不思飯食。喜食麪食及香燥之品。每日食飯一頤。尚不及一碗。而食麪則可盡一甌。且食麪可以按日更衣。食飯則間日不等。勞神過度。則夜不能安眠。必服數片安眠藥餅方可酣睡。甚或日間亦有時心煩。亦須服一二片始覺舒適。前閱貴報載有明礬和烏賊骨研末。可治耳內流水。因如試之。匪惟無功。而堵塞更甚。益以右偏頭痛。耳後與核三四箇。作痛發炎。偏經中醫診視。據云左關脈弦大而搏。為木氣太盛。挾少陽膽火上擾所致。投以柔肝益陰和胃降逆之劑。頭痛得除。耳後之核亦消。因思平素夏令足指岔必瘙而出水。今則未發。復診時舉以告醫。醫謂意者溼邪內伏。濁陰之氣上擾清道耳。改投輕清宣化苦溫燥溼之品。連服數劑。晤塞未稍減除。近則不服藥餌。惟以萬金油擦之。病經截餘。莫能獲效。素仰貴報諸同志醫學淵源。經驗宏富。請賜良方。俾克就痊。至為銘感。(林茂如)

(答)胸脇不舒。喜麪食。乃肝胃不和。胃液過多之故。柔肝和胃。最為上乘。可用橘葉。砂仁。杜蠣煎湯代茶。耳鳴而流膿水。乃局部病症。不必服藥。服藥亦無效。明礬烏賊骨少加冰片。確為良法。惟每日宜捲除二次。捲後再摻。焉能堵塞。多靜養。少思慮。切勿過於勞心。使得熟睡。安眠藥餅。無益有害。望勿常服。

伏暑醫療南鍼(十二)

宋愛人

致伏暑胸發白痦。則未可以一概論焉。蓋伏暑而挾有溼熱者。其氣之邪。本屬如霧如煙。瀰漫不化。即有不早進石斛。亦有邪從肺衛表分透解。發為白痦。例如徵之順者。一進輕舒氣分。如藿(藿香)樸(厚樸)杏(杏仁)貝(象貝母)等劑。往往微微汗出。隨見白痦。胸悶頓舒。此為伏暑證中見象之佳者也。與庸工造成白痦其事實絕不類同。然總以晶圓粒錠。色有玉樣者佳。如枯痦則殆矣。此處最要探其津液。如痦粒明錠者。治法以杏貝等類已足。如痦粒枯滯。勢難認為樂觀。急進增液。玉女煎以挽救之。

鮮石斛 生石膏 陳粳米 北沙參 鮮梨汁 真川貝 真雲苓 天花粉
鮮生地 生知母 京麥冬 鮮藕汁 白杏仁

論伏暑邪結太陽膀胱蓄水蓄血并出治法(十)

膀胱為州都之官。體陰而用陽。質濁而氣清。故暑溼重濁之邪。得以下趨而內結膀胱也。此處一有暑溼重濁之邪。勢必清氣痺塞。水氣不化。猶之雲不升雨不降。江漢之水流澁凝而萬物將枯槁待斃矣。故蓄水之證。渴而欲飲。飲水即嘔。小便不利。有如癃狀。治之之法。一面清熱。一面通陽。清熱須避苦寒。通陽又忌溫燥。葉天士云。熱病救陰尚易。通陽更難。救陰不在養血而在增津液。以資灌溉。通陽不在溫。而在疏通氣化。以利小便。上好肉桂、生川黃蘗、二味研成極細末子、(分量臨時酌定)、白杏仁。煎湯送下。然又有胞(即尿胞)痺。氣。瘀之極者。溫化金液丹。四五分。亦無不可。待其陽氣旋轉。則小便自通。而渴亦可解。煎劑以竹葉石膏湯加杏貝桔橘等。以宣通上脘。分行下焦。蓋金水同源。源清則泉流自長矣。然又有液枯水竭而小便不利者。法當甘潤養液。不獨溫燥不可投。即淡滲如車前澤瀉等。以強利小便者。亦不可用。兩者不分。醫殺之也。

再論蓄血病者。素有瘀血。為癥為癖。積於少腹。鄰近膀胱膀膜之處。未病之前。雖有隱伏。尚未顯著。及至伏邪結滯膀胱之腑。熱傷津液。瘀鬱之血。頓形乾燥。肝體神經遂失柔和。而為頭搖目瞪。發躁如狂。甚則血厥。面青唇黑。手指搐搦。厥回則腕腹串痛。身重不能轉側。正氣內結。屢下膠粘如醬。渴而漱水不能下嚥。小便自利。舌色紫黑。揩之滑潤。此瘀熱在裏。內經所謂蓄血在下。其人如狂是也。輕則清暑化瘀煎。重則破血逐瘀湯。極重用新加抵當湯。稀蟲豸下走之品。以趨逐之。此證男女均有。而昧者多不識也。爰立竹葉石膏湯。清暑化瘀煎。破血逐瘀湯。新加抵當湯等。以備臨時消息之。

竹葉石膏湯(新訂)
淡竹葉 生石膏 生知母 生薏米 粉甘草 白杏仁 象貝母 玉桔梗 炙橘白

清暑化瘀煎
綿茵陳 青連翹 黑山梔 西赤芍 單桃仁 粉丹皮 瓜蔞仁 淮牛膝 赤茯苓

破血逐瘀湯
烏犀角 鮮生地 當歸尾 單桃仁 西赤芍 川錦紋 綿茵陳 香青蒿 薏米仁

新加抵當湯
烏犀角 當歸尾 單桃仁 川錦紋 炙山甲 醉地鼈 夜明砂 延胡索 真麝香

論伏暑邪陷少陽晝則明了暮則譫語婦人有經水適來并出治法(十一)

以六經之開闔言。則少陽為樞。以臟腑之生成言。則少陽膽腑屬於肝。肝膽均在胃之右翼。故邪陷少陽。其來路為胃。其去路為肝。開則邪從陽出。闔則邪從陰入。此本證所以晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀等危惡之候也。治法當清其來路。截其去路。白虎合柴芩清膽湯。消息之。如便秘怫鬱者。加更衣丸。合雪羮湯。以兼清腸通便。然邪陷少陽。婦人往往有經水適來者。方書謂之挾經傷寒。世俗竟與男子之夾陰傷寒同為險證。然亦有適應訊期而來者。或經水下行。既通且暢者。能得熱從瘀血透泄。而下。亦未可妄謂惡候。若不應訊期而竟瘀熱動血。或既行之後而又中途結滯者。頗屬危候。然亦非必死之證也。清暑化瘀湯。破血逐瘀湯(兩方見前)加柴芩等消息用之可也。

大衆醫療指導

咳嗽自療法

全一冊價二角

□細目列下□
(特售一角六分)

▲咳嗽新解
▲咳嗽總論
▲感風而咳自療法
▲感寒而咳自療法
▲感暑而咳自療法
▲感燥而咳自療法
▲感溼而咳自療法
▲感火而咳自療法
▲感飲而咳自療法
▲肝逆咳嗽自療法
▲肺脹咳嗽自療法
▲肺癰咳嗽自療法
▲早晨咳嗽自療法
▲暮夜咳嗽自療法
▲半聲咳嗽自療法
▲酒客咳嗽自療法
▲胎前咳嗽自療法
▲產後咳嗽自療法
▲痧後咳嗽自療法
▲百日咳之自療法
▲咳吐黃痰自療法
▲咳吐綠痰自療法
▲實咳音濇自療法
▲實咳音啞自療法
▲虛咳音濇自療法
▲虛咳音啞自療法
▲咳嗽吐血自療法
▲咳嗽泄瀉自療法
▲咳嗽要方十四則
▲咳嗽問答十六條

□發售處□
上海三馬路千頃堂書局
上海四馬路春明書局
上海山東路中醫書局

總批發處
上海城隍廟前
文藝書局
館驛街十八

長壽

于右任題

每份四分 第二十七期

中華民國念一年十二月九日

內政部登記證警字第一一二七號

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

墮胎問題
痔瘡便血方
乳少增多法
立止盜汗法
立止嘔吐法
痢疾簡效方
便秘簡效方
紅眼睛自療法
論生殖作用(三)
食色之標準度數
產後急症五種
小便不通自通法
生無肛門者之處置
姑媳不和肝氣頻發
談談濕胞生
癡狂之簡治法
婦女之尿急病
陰虛之癆嗽
鼻流臭膿
腦漏兼痔
好食麪及香燥之品
伏暑醫療南鍼

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師為常年法律顧問◉

墮胎問題

▲法律上厲行禁止……毫無變通之餘地

▲醫學上看事行事……又當通權而達變

【鳳懷】

先說法律再談醫學

當未入本題之前。先述一墜胎趣事。以為本篇之發端。余有一女戚。子女繞膝。生殖力。尚未減。甚至一年而生兩胎。以不堪產育之苦。百計求避孕之法。卒無效。前年又復懷孕。思所以墜之。暗中訪求墮胎之法。及善於此道之人。後果如其所願。服藥以後。即大出血。下血塊甚多。自此體力衰疲。精神不振。如逢大病。莫能操作。奄奄不能起牀者四月有餘。分娩之期。仍舉一雄。惟以前次出血過多之故。胎兒失於營養。羸弱不堪。且產時又十分艱難。求福而反召痛苦。事後與人談及此事。常追悔前日之多此一舉也。

墮胎一事。雖為法律所禁。而仍不能或免。致女人所以墮胎之由。不外乎二。其一即為子女衆多之累。受盡生育之苦味所致。其二為桑間濮上。私行結合。春風一度。珠胎暗結。以顏面之關係。名譽之所在。故出此下策。以圖消滅形跡。前者為少數。後者則佔其多數。法律之不罰自殺自傷而罰自行墮胎者。以胎兒非人之身體之一部。而為法律所保護之獨立物體。墮胎則先於其自然分娩之時期而以人為的排出胎兒於母體之外。侵害胎兒出生之自然之母體。故不能不厲行禁止。然在吾國畸形發展之社會狀況之下。對於子女之養育過多者。既無救濟之法。對於懷春之男女。又無從為之防範。前者生計所關。後者又名譽所在。凡事之與生計名譽發生問題者。往往冒天下之大不韙。不惜違法一試。此墮胎之舉。所以不因法律而絕跡也。

以醫學而論。墮胎一事。實不能絕對加以禁止。醫生對於請求墮胎者。亦不能加以拒絕。在某種情形之下。當如其所願為之施行。所為某種情形者。如(一)胎兒判定有神經或身體方面之病態者。(二)胎兒產生時能危害產婦之生命或康健者。(三)家庭經濟困難。小孩生下。不能受適當之撫育者。(四)因欺騙或強迫發生性的關係而成妊娠者。(三)與(四)固有討論之餘地。而(一)與(二)實有墮胎之必要。惟此中有一先決問題。即施行此墮胎手術者。以何種為合格。應否受法律之規定。以防發生意外之弊端。

□愛情障碍

愛香惡臭…人之恆情。鼻流濁涕…腥臭異常。愛情破產…理所必然。挽救之策…其惟保腦。程君青心。為本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見幸福書局代售保腦丸。可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

風流小病

世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也搯得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。白相堂子。逛逛馬路。其樂無窮。然而樂極每易生悲。因此有的患遺精。有的患白濁。時有所聞。幸福書局代售的遺精敵(專治遺精)白濁丸(專治白濁)都是對症的靈藥。

遺精敵…每盒一元
白濁丸…每盒一元

實用驗方

▲痔瘡便血方

凡因痔而便血者。服臟連丸三錢。飯前吞服。奇效。

(按)臟連丸用黃連以清大腸之火。豬腸以引藥入腸。故治無不效。惟須肛門墜腫。血色正赤。日久不止。腹不痛。裏不急者方宜。若血色晦淡者禁用。

▲乳少增多法

凡新產後乳汁稀少。可用王不留行。瞿麥穗。麥門冬。穿山甲。龍骨各等分。研為細末。每服一錢。熱酒調下。一日三次。服後食豬蹄羮少許。

(按)麥冬補肺金以生乳汁。王不留行瞿麥穗行水液而下乳汁。加龍骨者。取其有興雲行雨之靈妙也。加穿山甲者。以其有穿通經絡之能力也。若因氣血壅滯而乳汁不下者。以此下之。則乳如湧泉而來矣。

▲立止盜汗法

凡寐則汗出。醒即汗止者。名曰盜汗。可用碧桃乾三錢。糯稻根鬚一兩。紅棗五枚。煎湯。候溫。臨臥服之。其汗即止。

▲立止嘔吐法

凡女子嘔吐不止。而帶有酸水者。吞服左金丸一錢。無不立效。

▲痢疾簡效方

凡腹痛痢下赤白。裏急後重者。因溼熱滯鬱於曲腸。氣機流行窒塞所致。速購香連丸一錢。開水吞服。忌食一切生冷油膩之品。

▲便秘簡效方

大便秘結。則腸中宿垢不得排泄。有礙血液之循環。宜用番瀉葉錢半。泡湯飲之。立通。

(按)番瀉葉其價最廉。通便最捷。良藥也。

▲紅眼睛自療法

凡紅眼睛初起之時。速即購服龍膽草一錢。翌日即愈。外治法用黃連汁合人乳。點眼角。忌食辛辣之物。

(按)龍膽草性苦寒。功能退熱平肝。故目疾暴發。用之頓安。

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

論生殖作用(三)

(阮其煜)

(問)房事度數。以若干爲適當耶。

(答)此爲最困難之問題。常依人生體質之強弱。及年齡。生活狀態。氣候等。而各不相同。實際則歐美人較日本人度數爲多。而強壯之人。又較虛弱之人度數爲多。在日本古諺有云。春三夏六秋一冬孤(謂春季每月三次夏季每月六次秋季每月一次。冬季則夫婦孤居。並一次而無之也。)此言誠爲適當。然使人人據之以爲標準。是又難能之事。今就無病健全之人以爲準繩。而依生理學所認爲無害之適當度數言之。則自二十歲至三十歲之人。可一禮拜二次。自三十歲至四十歲之人一禮拜一次。自四十歲至五十歲之人。則一個月間僅可二次。至於五十歲以上。宜以禁絕房事爲上乘矣。然在身體之營養豐盛。生活安全。足以保持其康健者。即五十歲以上。偶一爲之。亦復無妨。而青年之身體羸弱。且滋養不豐者。反宜在所當禁之例。至於從事學問之時。於此事亦決不相宜。又女子當月經開始後。未滿一年之期內。更宜堅禁之。大凡月經來潮。其身體殊與生殖器有種種之證明。故女子初有月經時。譬之名花乍蕊。胚胎醞釀。功候未深。豈能受暴雨橫風之摧折。能此時其身體上驟來一絕大之變動。苟再與以外來之刺戟。實於衛生上。爲最不適當也。

(問)月經中行房事者。人多以爲非。可言其利害歟。

(答)月經時。女子生殖器有顯著之充血。即如子宮內黏膜之血管。大率均經破裂而成新瘡。抵抗力弱。最易沾染毒氣。故不可不俟其瘡面平復。而使身體清潔也。又月經時。精神上必有若干之變化。易於感動。此時如突然交接之。必致意外之疾病。且必起子宮內膜炎。或起膣加答兒。或即爲構成精神病之惡原因。故最宜切忌。昔時日本風俗。以月經乃一種至爲不潔之物。凡女子在月經中。雖其夫之側。亦不容坐立。況與同衾。至今沖繩地方。及八丈島人。尚有於村外別置小室。以備女子月經中坐臥其處者。此風蓋尚存也。此事雖原於宗教上而來。而與衛生法。頗爲自然相協。蓋使其夫不勞其身體精神。並藉以安慰其夫。亦夫婦之情應爾也。

(問)娠妊後幾個月。乃戒房事乎。

(答)動物一旦受胎。則不復交接。而遠避其牡。惟人類欲依此而行之。其勢恐有所不能。使人類而同其他之動物。一經受胎。則互相避忌。未始不爲上乘。然苟持之過嚴。於實際上必有兩難相副者。惟勉爲適當之注意。斯可耳。其最要者。爲交接過度。或婦人有所痛苦。或意有不適時。亟宜廢止。自無待用。大率五個月以上者。斷不可不及時廢止之。何則。以此時生殖器屢受刺戟。則神經機能。易起障害。而致流產。流產之害。至爲重要。此爲人之所宜知者。大凡適當之分娩。猶之瓜熟蒂落。爲適合於天然之生理。苟無橫產及其他意外之障害。高枕無憂也。惟此流產。爲一種至重危之險症。且因擾亂而起之流產。與墮胎同。胎兒之死亡無論。即母體之生命。亦極瀕於憂危。其終生身體。必致陷於虛弱。然即幸而不致流產。而母體必受無窮之痛苦。甚或遂致難產。或使不良之影響。及於胎兒。此則所宜銘心刻骨識之者也。

食色之標準度數

沈仲圭

偶閱機聯會刊四十五期。有衛生聯語二十字。「吃飯標準。每次兩盌三盌。性慾標準。每次十天八天。」考董仲舒論養生曰。「新壯者十日而一遊於房。按即十日同房一次。中年者倍新壯。始衰者倍中年。中衰者倍始衰。大衰者。以月當新壯之日。按即十月同房一次」王吉民注云。『房事度數。以若干爲適度。當人人殊。蓋體質有強弱。年齡有大小。生活狀態。氣候環境。亦各不同。難示一定之標準。然依生理學者所認爲普通適當度數言之。則少壯之人。月可四次。按年減少。與董子「新壯者十日一遊」無甚出入。』節錄中國歷代醫學之發明。故以八天至十天爲青年性慾標準度數者。固極平衡之論也。若夫吃飯。歐洲中等勞動者每日之標準食料。爲瘠肉半磅。牛乳四合半。飯四分之一磅。麵包半磅。中士衛生。重精神而略形體。吾人每日所食。究以若干爲適度。自古迄今。未有研究而規定之者。然中等勞動之成人。每日三餐。每餐三盌。下飯之物。葷素俱備。律以生理。似無不合。孔子曰「飲食男女。人之大慾存焉。」吾人於至要認爲大慾之食色。倘此標準度數而競勿失。養生之道。思過半矣。

產後急症五種

贊庭

(一)產後言語顛狂。眼見鬼神。乃敗血攻心所致。急用當歸一錢。酒半鍾煎湯。童便三分冲服。

(二)產後失音不語。是七孔三毛九竅。多被血冲閉。所以言語不得。用延胡索。棕皮各一錢。煎湯。入陳酒三分服。

(三)產後昏迷驚恐。氣逆咳嗽。四肢寒熱。口乾心悶。或背痠腹脹。皆因血未還原。吃熱物麵食。致有此症。日久甚至月經不通。黃赤帶下。而小便或滑或脹。急用椑柳根杏膠各一錢。煎湯。陳酒三分冲服。

(四)產後腰痛眼瞪。或渾身拘緊。牙關緊閉。兩脚如弓狀。如中風者。百日之內。過行房事耳。用當歸三錢。大紅雞冠花三錢。煎湯。入陳酒三分服。

(五)產後臟腑不安。言語不得。咽喉作蟬聲者。乃月中誤吃熱物。或停宿食而敗血攻注喘息。甚致牙關緊閉。用乳香一錢煎湯入。陳酒三分服。

小便不通自通法

祥裕

小便不通。治療上較大便不通爲難。因大便不通。可用番瀉葉元明粉等攻而瀉之。不然。可用大腸注射法。若小便不通。既不能攻瀉。又不能注射。久蓄不出。勢必脹痛難忍而變成水腫。按小便不通之原因。西醫謂爲膀胱炎。中醫謂爲氣化不宜。二說似異而同理。以膀胱乃蓄水之處。小便之通閉。純是括約筋之開闔。膀胱發炎。熱結水蓄。氣化不宜。不宜則不通也。可急用鮮車前草。鮮藕節搗汁。燉溫冲服清熱利水。自無不通矣。

育兒日記

生無肛門者之處置(廿一)

尤學周擬

十五日。晨起閱報。載有一嬰兒生無肛門而遭慘死之新聞一則。畧謂某姓家產一男孩。闔家歡天喜地。預擬邀友宴戚。不料三朝之日。不啼不聲。神色甚爲難堪。且產後從未大便。探視其下。後路不通。乃一無肛門者。急延醫處置。索手續費伍十元。講價既畢。遂施手術。於尾閭骨下割一洞。割後。出血不止。不久即死云云。此慘劇之造成。第一在於家人之疏忽。嬰兒一日不大便。已宜注意。乃延至三日。神色轉爲難堪。方始發見缺少肛門。已屬疏忽非常。更延一無經驗之醫生。妄動刀圭。禍起於不測。第二在醫生之妄庸。醫之治病。不在乎有自信力。而在乎有確實之經驗。施行手術。經驗尤宜先着。苟有經驗。何致出血。更何致喪生。

據古籍所載。此症可分爲二。其一因熱毒太甚。壅結肛門。並未全合。有一線之小孔可通者。急服黑白散。(黑丑。白丑。大黃。元明粉。檳榔。陳皮。甘草。)外以手輕輕拍之。其二爲脂膜遮瞞。無隙可通。先以鉛刀。或金玉簪。刺破脂膜以油紙吹插入隔之。不令合。前者爲病理的。故當服藥。後者爲生理的。先當施行手術。然此皆輕淺之症。故易於設法。其甚者。一片平坦。無凹陷之遺跡可尋。則難於著手矣。嬰兒生無肛門者。據有經驗之醫生謂依其形狀之不同。可分爲三種。(一)肛門之原形不差。但其門內或門外有皮一層隔之。治法甚易。不過穿通此皮而已。(二)肛門之口。不直通身外。爲道幽徑。封閉不通。於應有肛門之處。祇有一凹。其治法較難。必待若干時。以手壓住其腹後。向凹處用力割之。(三)原無肛門。或不顯出。所謂密窟深藏。無路可通者。則無法能在應有肛門之處使通。必在背上假肋之下開通之。至遇肛門而後止。如小兒之患第(三)種者。大牢難醫。因有此症者。常兼別病故也。即此而論。第(一)種尚可自己施治。(二)與(三)非延能手不可。否則必蹈某姓之覆轍也。

上海新新公司 常年醫藥顧問

朱振聲 醫士

診例

(甲)門診一元 號金不收

(乙)出診四元 路遠遞加

(丙)膏丸方四元 隔日取件

(丁)外埠問病二元 原壹回件

(戊)急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止出診四時以後

診所 上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話 九一四九二

掛號處啓

診餘隨筆

姑媳不和肝氣頻發(二)

朱振聲

大家庭中。有一最不改良之現象。即姑媳妯娌之間。爭吵不安是也。幸而不爭吵。各懷異志。面和而心不和。而姑媳之間。以尊卑之別。感情益易閡隔。舉動之間。引起無謂之猜疑。疑則生心。侵漸而弄假成眞。口舌是非。從此起矣。俗云。「河灘上講阿婆。(姑也)佛堂裏罵媳婦」。事之由來已久。其風亦普遍於國中。而爲媳者以蒙卑之故。每爲所屈。有怨莫訴。鬱積於懷。發爲肝氣之疾者。比比然也。

國醫之所謂肝。有實質與假借之別。實質之肝。指肝之本身而言。即心「肝」脾肺腎之肝。假借之肝。指神經而言。肝氣者。乃神經之一種作用。因其發作時。適在肝之部位。故以肝氣二字。籠統呼之。大凡疼痛之症。皆與神經有關。某部之神經感受刺激。則某部發生疼痛。婦女情懷不暢。鬱然寡歡。則神經刺激。所謂肝氣痛之症。由此而起。

李女士。爲知識界中人。就診於余。自謂胸脘痞悶。有時絞痛異常。按其脈。細而弦。問其境遇順遂否。曾和人有意氣之爭否。初余以爲失戀或別有曲衷。因無個郎相伴。未料其廚下洗手。羹湯已調。羅敷固有夫矣。伊乃述其夫家瑣事。並失歡於姑。常受譏訕。近日刺激過甚。情緒惡劣。故此症發作尤頻。乃勸以逆來順受。切勿過於認眞。此症首在暢情放懷。有博大之胸襟。若燈下彈淚。暗室飲泣。效舊式女子之消極態度。徒自苦耳。爲處一疏肝調氣之方。

炒蔞皮錢半　青陳皮各八分　白蔻仁(次入)五分
延胡索錢半　製香附錢半　炒白芍錢半
川楝子錢半　廣鬱金錢半　川朴花七分
佐金丸(包)七分

談談瀝胞生

程次明

難產原因不一。楮犨未能盡醫。坐蓐之時。胞漿破瀝。延時漿水瀝盡。胎不下落。俗呼爲瀝胞生。須知無水舟停。穩婆未可亂施手術。譬如舟在河中。水涸。焉能行動。治宜急助其水。以資其轉運。用鮮猪肉二斤。急火煎清湯。吹去浮油。令產母徐徐飲之。此血肉有情。生水最速。飲下即可增漲漿水。舟得水活。行動自由。胎下順利矣。

更有胞漿破瀝。遷延時日。胎不下落。不特漿水瀝盡。並且語言乏力。口中大渴。是氣血兩虧。乃一身氣血。驟爲胞胎所吸收而被耗傷。泄者去矣。存者微乎。此非猪肉湯所能奏功。必須服大補氣血之劑。以助長其氣血。而資胎氣之流動。胎獲氣血之資助。自然順流下落矣。列方於右。以供採擇焉。

熟地一兩。綿芪一兩。當歸四錢。川芎一錢。白芍一錢。杞子四錢。敗龜版四錢。洗去垢。血餘三錢。黨參四錢。

此方氣血雙補。合參開骨散。或產婦頭生。交骨不開。服之亦有功效。或試胎腹痛。分娩時機未至。服之亦能定痛安胎。

痴狂之簡治法

張贊臣

原因　由於先天遺傳。或因環境之壓迫。及所願不遂。憂鬱而發。

病狀　有靜躁之別。靜者。知識欠靈。記性減退。不思飲食。自言自語。或少言語。獨來獨往。厭與人羣。俗謂之文痴。或狂聲叫囂。登高疾走。或損毀器物。操刀逐人。俗謂之武痴。

療法　凡一切刺激之物。皆宜禁絕。所以避精神之感動。侍疾者。須伶俐而有耐心之人。善伺承患者之意。一面不拂逆其心志。一面又宜矯正怪癖。古方生鐵落飲(鐵屑。水煎飲。)吞服大黃䗪蟲丸四錢。以下黑便爲度。可愈。或用辰砂水飛。白礬煅。各等分爲末。水丸。黃豆大。每一丸。人參煎湯下。上方治武痴甚效。下方可治文痴。

婦女之尿急病

石蘊華

婦女出門。最不便者。莫如小便。故每於出門之前。必小便一次。戒飲茶水。一面增加膀胱之容量。一面減少尿量之增加。如旅途太長。及時間過多。必勉強忍之。習之既久。膀胱之調節失宜。遂成尿急之病。有如痢疾之裏急後重。尿意頻起。量又不多。不可徒用利小便藥及濇劑。愈利則愈短數不禁。愈濇則反增澀痛。當兼用補氣之品。如黨參。焦朮。陳皮。肉桂。雲苓。生芪。山藥。車前子。福澤瀉。斟酌用之。或用酒浸木瓜一枚。煎水服。病輕者一服即愈。重者亦不過四五次。方雖平淡。實有奇效。

陰虛之嗽

程金麟

【原因及病理】本症多由外感咳嗽。延久失治。或先有諸般失血。終由陰虛火動。火熱灼津。相互爲因。則肺安有不傷之理。

【病狀】形色不充。咳嗆少痰。連咯難出。或痰內帶紅。至夜益甚。舌苔光絳。脈來細數。

【治療】天麥冬各二錢　川貝母三錢
冬虫草錢半　熟女貞二錢
懷山藥二錢　炙紫菀一錢
茜艸根二錢　粉丹皮二錢
炙枇杷葉三錢(包)

◉朱振聲醫士編著之醫藥常識書

婦女病全書	二冊	實售大洋一元
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保腦新書	一冊	實售大洋四角
腎病研究	一冊	實售大洋四角
長壽寶鑑	一冊	實售大洋六角
怪病奇治	一冊	實售大洋八角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
家庭實用驗方	一冊	實售大洋一角

論生殖作用(四)

(阮其煜)

(問)分娩後經若干日。方可同衾而無妨礙耶。

(答)產輕。且爲成規之經過者。至少亦須經過五十日後。方可同衾。蓋凡新產者。其生殖器必受無數之新瘡。此瘡最易傳染病。及其他不潔之物所侵入。故當力保其清潔。不可有一毫他物攙雜及之。且其既破無數血管。日復一日。正待平復。而復受外來之刺戟。必且再行破裂。而致出血。或遂起全身貧血之症。其子宮及膣腔。當娠妊及分娩時。既以極度擴張。產後漸次收縮。然非經過七禮拜。亦勢難復元。此時苟驟與刺戟。以妨礙其收縮之力。將不免子宮後屈。或致有種種之轉位等矣。實際。分娩後早行房事者。往往使婦人腰曲不能復直。或使乳汁全無。或致終身病弱。蓋時有所聞也。爲人夫者。得毋少安勿躁。謹收此戒乎。

(問)酒者。不獨催進淫慾。且能使人有一種至快極美之感覺。醉中之交接。果有害歟。

(答)酒爲一種麻醉藥。飲之能使人精神奮興。情慾發動。乍觀之似爲一種無上之奮興藥。雖然。此特皮相之言。未知酒之本性也。大凡人之身體。有奮興神經。與制止神經二者。酒之第一性。在使制止神經麻醉。而驅使奮興神經。異常動作而大奮興。及至於大醉。則雖奮興神經。亦並使之麻醉而毫無所知。在精神的動作之方。平日原以理性制止情慾。至一朝痛飲。則第一之理性。既行麻醉。惟此情慾。獨占優勝之一方。忽而色慾大起。即並其他種種之慾望。亦無術以遏制之。此時苟誤認爲奮興之時期。一任感情之動作。而暢行房事。則一旦清醒。必致非常之衰脫矣。且使所接而爲娼妓或不潔之婦人。則更有因相持過久。以致傳染花柳惡病者。又自胎兒一方面而觀之。凡醉中所製造小兒。長成之後。必多癲癇。白癡。及其他種種之精神病。或則身體虛弱。試觀各國統計可以洞明其故已。酒之爲害及於生殖作用。如此其慘。此實可爲恐怖而且宜愼之又愼者。今使再就酒精之及於精蟲之作用而證明之。則凡精蟲於酒精飲料之中。必彼此互相衝突。迴旋反覆。上下顛狂。如不堪其怒者。舉動既久。旋即醉痺而殭。假令直接於酒中。則又加甚焉。然則吾人如既經飲酒。此時半狂半惑之精蟲。萬一一旦受胎。果能爲健全之小兒而生耶。抑將半狂半惑之小兒耶。此無論何人。皆不難想預者也。(完)